

Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы в баллах (I-PSS).

| Шкала I-PSS | Никогда | Реже чем 1 раз из пяти | Реже, чем в половине случаев | Примерно в половине случаев | Чаше, чем в половине случаев | Почти всегда | |
|--|-----------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания? | | | | | | | |
| 2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания? | | | | | | | |
| 3. Как часто в течение последнего месяца у Вас имелось прерывистое мочеиспускание? | | | | | | | |
| 4. Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания? | | | | | | | |
| 5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была слабая струя мочи. | | | | | | | |
| 6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться, чтобы начать мочеиспускание | | | | | | | |
| | Нет | 1 раз | 2 раза | 3 раза | 4 раза | 5 или более раз | |
| 7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью с постели, чтобы помочиться? | | | | | | | |
| Суммарный балл по I-PSS = | | | | | | | |
| Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания | | | | | | | |
| Как бы вы относились к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни? | Прекрасно | Хорошо | Удовлетворительно | Смешанное чувство | Неудовлетворительно | Плохо | Очень плохо |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индекс оценки качества жизни L= | | | | | | | |

Клиника Урологии ПСПБГМУ им И.П. Павлова

<https://endouroclinic.ru/>

